

Betegtájékoztató

A beteg neve:	A beteg aláírása:
A beteg azonosítója:	

Arcon elhelyezkedő bőrelváltozás, szövetszaporulat (pl. basalioma) eltávolítása

Kedves Betegünk!

Az előzetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek az arcán elhelyezkedő daganata (basalioma) van, ennek eltávolítására van szükség. Az alábbiakban tömören megtalálható minden fontos információ a beavatkozással kapcsolatban.

1. A beavatkozás indikációi (elvégzését indokló tényezők):

Az arcon elhelyezkedő szövetszaporulat ismételten gyulladós jeleket mutathat, károsíthatja az arc szöveteit, ezért eltávolítása indokolt.

2. A műtét (beavatkozás) menete

Helyi érzéstelenítésben a daganatot teljes egészében eltávolítjuk, biztonsági zónával. Az anyagot szövettani vizsgálatra küldjük. Az eltávolítás eredményeként az arc bőrének egy része eltávolításra kerül.

3. Az érzéstelenítés lehetőségei, veszélyei

A helyi érzéstelenítés menetét a beavatkozás ismertetésénél részleteztük. Nagyon ritkán a helyi érzéstelenítéssel kapcsolatban felléphetnek az alábbi reakciók:

- allergiás reakció (duzzanatok, viszketés, vérkeringési rendszer reakciója, shock)
- idegrendszeri mellékhatások (nyugtalanág, görcsök, légzészavar)
- vérnyomás emelkedés, vérnyomásesés, szívritmuszavarok

4. Általános műtéti kockázat

A műtétek általános veszélyei, úgymint trombózis/embólia, sebfertőzés, keringési reakciók rendkívül ritkák. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek azonban: infúzió bekötése, centrális vénakatéter behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés során perifériás idegsérülést okozó nyomási károsodás, a nyaki gerinc sérülése is kialakulhat. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek. Kérdezze meg orvosát, hogy Önnél/ gyermekénél nem áll-e fenn fokozott trombózis, vagy embóliaveszély. A véralvadást befolyásoló gyógyszerek használata megnövelheti az utóvérzés rizikóját.

5. A műtét (beavatkozás) lehetséges mellékhatásai, veszélyei és szövődményei

a. Tipikus, illetve gyakori jelenségek a műtét (beavatkozás) után

A daganat eltávolítása után kialakulhat duzzanat, véraláfutás a seb környékén.

b. Ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények a beavatkozás után

A daganat eltávolítása után kialakulhat a seb elfertőződése. A daganat kiújulhat.

6. A műtét utáni időszak (kb. két hét) fontosabb teendői (amire figyelni kell!)

Arcát kímélje még a kisebb traumáktól, nyomástól is!

7. A gyógyulás várható időtartama és megítélése

A teljes gyógyulás hetekig tart.

8. A műtét (beavatkozás) elhagyásának várható kockázatai

A daganat ismételt fertőződése újabb területek gyulladós károsodását okozza az arcon.