

Betegtájékoztató

A beteg aláírása:
A beteg neve:
A beteg azonosítója:

Nyaki lipoma eltávolítása

Kedves Betegünk!

Nyakon elhelyezkedő, aspirációs cytológiai vizsgálattal lipomának bizonyult tokos, kiterjedt terime eltávolítása általános érzéstelenítésben. Lehetséges szövődmények: vérzés, sebgyógyulási zavar, idegbénulás (karemelési nehezítettség, rekedtség). A tervezett műtétről részletes felvilágosító beszélgetés során- a kezelő (műtétet végző) orvosom, kielégítően tájékoztatott. A beszélgetés során megválaszoltak minden engem foglalkoztató kérdést a műtéttel, a műtéti kockázatokkal és a lehetséges szövődményekkel kapcsolatban. Kijelentem, hogy maradéktalanul megértettem az írásbeli és szóbeli felvilágosítás tartalmát és nincs további kérdésem. Elegendő gondolkodási idő után beleegyezem, hogy a felajánlott műtétet – azok ismert lehetséges veszélyeinek tudatában – rajtam az orvos elvégezze.

1. A műtét (beavatkozás) menete

Altatásban a lipomának nevezett zsírdaganatot lehetőség szerint teljes egészében eltávolítjuk, az anyagot szövettani vizsgálatra küldjük. Az altatás lehetőségei, veszélyei (aneszteziológiai lapon részleteztük).

2. Általános műtéti kockázat

A műtétek általános veszélyei, úgymint trombózis/embólia, sebfertőzés, keringési reakciók rendkívül ritkák. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek azonban: infúzió bekötése, centrális vénakatóter behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés, műtéti előkészítés során perifériás idegsérülést okozó nyomási károsodás, a nyaki gerinc sérülése is kialakulhat. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek. Kérdezze meg orvosát, hogy Önnél nem áll-e fenn fokozott trombózis, vagy embóliaveszély. A vérárvadást befolyásoló gyógyszerek használata megnövelheti az utóvérzés rizikóját.

3. A műtét (beavatkozás) lehetséges mellékhatásai, veszélyei és szövődményei

a. Tipikus, illetve gyakori jelenségek a műtét (beavatkozás) után

A terime eltávolítása után gyakran alakul ki duzzanat, vérálfutás.

b. Ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények a beavatkozás után

A beavatkozás után előfordulhat sebgyógyulási zavar, elhúzódó sebgyógyulás, vérzés, idegsérülés.

4. A műtét utáni időszak (kb. két hét) fontosabb teendői (amire figyelni kell!)

Fülét, fülkagyló és a műtéti terület környékét óvja nyomástól, víztől.

5. A gyógyulás várható időtartama és megítélése

A teljes gyógyulás hetekig tart. Ekkorra megszűnik a sebkörnyéki duzzanat, vérálfutás, és kialakul az áthámosodás a műtéti területen.

6. A műtét (beavatkozás) elhagyásának várható kockázata

A terime további terjedése újabb területek roncsolását okozhatja a fülkagyló mögött.