



Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház
Szemészeti osztály

**Daganat eltávolítás,
plasztika / Tumor exstirpatio
cum plasticam**

SZEM - TUM

Kidolgozta: Dr. Nemes János

Kidolgozás dátuma: 2011.11.14.
2. verzió

Betegtájékoztató

1. Betegségemről (amennyiben már ismert), amely kórisme szerint magyarul/ latinul

Szemhéjon és/vagy szemkörüli területen kialakult elváltozás, daganat / Tumor

2. A javasolt vizsgálatokról / gyógymódokról, mely magyarul

Általános szemészeti vizsgálat. Az eltávolított daganat szövettani vizsgálatra küldése./ A daganat eltávolítása mélyen az ép szövetekben vezetett metszéssel, bőr illetve szemhéjak hiányának pótlása elcsúsztatott, elforgatott vagy áthelyezett nyeles bőrlebenyekkel, szabad bőrátültetéssel, sebzés varratokkal.

3. Valamint annak kockázatáról:

Vérzés, a környező bőrterületek alávérzése, a varrat elégtelensége, gyulladás, szövetelhalás, hegesedés. Későbbiekben kiegészítő műtét válhat szükségessé. Minden bőrmetszés heggel gyógyul, a megfelelő irányban vezetett hegek kevésbé látszanak. A műtéthez szükséges érzéstelenítő anyag beadása után allergiás reakció alakulhat ki.

4. A műtéthez szükséges érzéstelenítési eljárás:

Helyi érzéstelenítő csepp (Oxybuprokain csepp) és injekció, vezetéssel érzéstelenítés.

5. A beavatkozás után kímélő életmód javasolt, különösképpen fontos a seb és környékének kíméléte.