



Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház
Szemészeti osztály

Fisztulaképző műtét Trabeculectomia

SZEM - TRAB

Kidolgozta: Dr. Nemes János

Kidolgozás dátuma: 2011.11.14.

Betegtájékoztató

1. Betegségemről (amennyiben már ismert), amely kórisme szerint magyarul/ latinul

Zöldhályog / Glaucoma

2. A javasolt vizsgálatokról / gyógymódokról, mely magyarul

Általános szemészeti vizsgálat, szemészeti ultrahang vizsgálat. / Kötőhártya megnyitása, ínhártya ablak készítése, szivárványhártya kimetszés, sebzés varrattal.

3. Valamint annak kockázatáról:

Szemnyomás emelkedés/csökkenés, szaruhártya borússág, szem szöveteinek sérülése, vérzés, belső szemgyulladás, szürkehályog képződés, fénytörésváltozás, ideghártya vizenyő és leválás, érhártya leválás, látásvesztés, szemgolyó elvesztése

4. A műtét során orvosilag indokolt esetleges további beavatkozások:

Üvegtest eltávolítás, elülső csarnok feltöltése.

5. A műtéthez szükséges érzéstelenítési eljárás:

Helyi érzéstelenítés (Oxybuprokain csepp, kötőhártya alá adott érzéstelenítő injekció)

és/vagy

Vezetékes érzéstelenítés – szemgolyó mögé adott (retrobulbaris) érzéstelenítő injekció. Az injekció beadását követően oculopressor nevű eszközzel nyomást gyakorolunk a szemre.

6. A retrobulbaris érzéstelenítés kockázatai

Szemhéj véraláfutása, szemhéjcsüngés, kettőslátás, látóideg sérülése, szemgolyó falának sérülése, allergiás reakció a beadott anyagra, fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés, szapora pulzus, nagy mértékű vérnyomáscsökkenés, életveszélyes keringési zavar, gégeödéma, légzésleállítás, tudatzavar, görcsök, eszméletvesztés, halál

7. A beavatkozás után kímélő életmód javasolt, különös-képpen fontos a seb és környékének kíméléte.