



Pest Megyei  
**Flór Ferenc Kórház**  
**Szemészeti osztály**

**Másodlagos zöldhályog /  
Glaucoma secundarium**

**SZEM - CPC**

Kidolgozta: Dr. Nemes János

Kidolgozás dátuma: 2011.11.14.  
2.verzió

### ***Betegtájékoztató***

**1. *Betegségeről (amennyiben már ismert), amely kórisme szerint magyarul/latinul***

Másodlagos zöldhályog / Glaucoma secundarium

**2. *A javasolt vizsgálatokról / gyógymódokról, mely magyarul***

Általános szemészeti vizsgálat, szükség esetén szemészeti ultrahang vizsgálat. / A sugártest funkciójának lézeres csökkentése a csarnokvíz termelés csökkentése céljából.

**3. *Valamint annak kockázatáról:***

Szemnyomás csökkenés elmaradása vagy túlzott mértéke, szaruhártya borússág, szem szöveteinek sérülése, vérzés, látásvesztés, szemgolyó zsugorodása, szemgolyó elvesztése.

**4. *A műtéthez szükséges érzéstelenítési eljárás:***

Helyi érzéstelenítés (Oxybuprokain csepp) és Vezetékes érzéstelenítés – szemgolyó mögé adott (retrobulbaris) érzéstelenítő injekció. Az injekció beadását követően oculopressor nevű eszközzel nyomást gyakorolunk a szemre.

**5. *A retrobulbaris érzéstelenítés kockázatai***

Szemhéj véraláfutása, szemhéjcsüngés, kettőslátás, látóideg sérülése, szemgolyó falának sérülése, allergiás reakció a beadott anyagra, fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés, szapora pulzus, nagy mértékű vérnyomáscsökkenés, életveszélyes keringési zavar, gégeödéma, légzésleállás, tudatzavar, görcsök, eszméletvesztés, halál