



Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház
Szemészeti osztály

Szürkehályog/Cataracta

SZEM - CAT

Kidolgozta: Dr. Nemes János

Kidolgozás dátuma: 2011. 11. 04.
2. verzió

Betegtájékoztató

1. Betegségemről (amennyiben már ismert), amely kórisme szerint magyarul/latinul

Szürkehályog (a szemlencse maradandó elhomályosulása)/ Cataracta

2. A javasolt vizsgálatokról / gyógy módokról, mely magyarul

Általános szemészeti vizsgálat, szemészeti ultrahang vizsgálat. / Az elszürkült szemlencse eltávolítása, műlencse beültetése

3. Valamint annak kockázatáról:

Szemnyomás emelkedés/csökkenés, szaruhártya borússág, szem szöveteinek sérülése, vérzés, belső szemgyulladás, ideghártya vizenyő, ideghártya leválás, látásvesztés, szemgolyó elvesztése, bizonyos orvosilag indokolt esetekben a műlencse beültetés nem történik meg.

4. A műtét során orvosilag indokolt esetleges további beavatkozások:

Sebnagyobbítás, üvegtesti műtét / vitrectomia, seb zárása varrattal

5. A műtéthez szükséges érzéstelenítési eljárás:

Helyi érzéstelenítés (Oxybuprokain csepp, szükség esetén az elülső csarnokba adott érzéstelenítő),

vagy

Vezetékes érzéstelenítés – szemgolyó mögé adott (retrobulbaris) érzéstelenítő injekció. Az injekció beadását követően oculopressor nevű eszközzel nyomást gyakorolunk a szemre.

6. A retrobulbaris érzéstelenítés kockázatai

Szemhéj véraláfutása, szemhéjcsüngés, kettőslátás, látóideg sérülése, szemgolyó falának sérülése, allergiás reakció a beadott anyagra, fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés, szapora pulzus, nagy mértékű vérnyomáscsökkenés, életveszélyes keringési zavar, gégeödéma, légzésleállás, tudatzavar, görcsök, eszméletvesztés, halál

7. A beavatkozás után kímélő életmód javasolt, különös-képpen fontos a seb és környékének kíméléte.