



Pest Megyei  
Flór Ferenc Kórház  
Szemészeti osztály

## Zöldhályogos roham / Glaucoma congestivum acutum

**SZEM - ACG**

Kidolgozta: Dr. Nemes János

Kidolgozás dátuma: 2011.11.14.  
2. verzió

### Betegtájékoztató

- 1. Betegségemről (amennyiben már ismert), amely kórisme szerint magyarul/latinul**  
Zöldhályogos roham (csarnokzug szivárványhártya általi elzáródása pupillaris blokk következtében, mely hirtelen szemnyomásemelkedéshez vezet)/ Glaucoma congestivum acutum
- 2. A javasolt vizsgálatokról / gyógymódokról, mely magyarul**  
Általános szemészeti vizsgálat, szemészeti ultrahang vizsgálat. / Szemnyomás csökkentő gyógyszerek alkalmazása. A szivárványhártyán nyílás készítése lézerrel (iridotomia) ill. műtéti úton (iridectomia: szaruhártyán sebkészítés, szivárványhártya kimetszés).
- 3. Valamint annak kockázatáról:**  
Szemnyomás emelkedés/csökkenés, szaruhártya borússág, szem szöveteinek sérülése, vérzés, belső szemgyulladás, ideghártya vizenyő, ideghártya leválás, érhártya leválás, szemfájdalom, látásvesztés, szemgolyó elvesztése  
A tartósan magas szemnyomás a látóidegrostok pusztulásához, maradandó látótér károsodáshoz, akár vaksághoz vezet kezelés nélkül.
- 4. A műtét során orvosilag indokolt esetleges további beavatkozások:**  
A szemlencse eltávolítása, műlencse beültetése. Üvegtesti műtét.
- 5. A műtéthez szükséges érzéstelenítési eljárás:**  
Helyi érzéstelenítés (Oxybuprokain csepp, szükség esetén az elülső csarnokba adott érzéstelenítő),  
vagy  
Vezetékes érzéstelenítés – szemgolyó mögé adott (retrobulbaris) érzéstelenítő injekció. Az injekció beadását követően oculopressor nevű eszközzel nyomást gyakorolunk a szemre.
- 6. A retrobulbaris érzéstelenítés kockázatai**  
Szemhéj véraláfutása, szemhéjcsüngés, kettőslátás, látóideg sérülése, szemgolyó falának sérülése, allergiás reakció a beadott anyagra, fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés, szapora pulzus, nagy mértékű vérnyomáscsökkenés, életveszélyes keringési zavar, gégeödéma, légzésleállás, tudatzavar, görcsök, eszméletvesztés, halál
- 7. A beavatkozás után kímélő életmód javasolt, különös-képpen fontos a seb és környékének kímélete.**