



Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház
Szemészeti osztály

**Utóhályog
/Cataracta secundaria**

SZEM - PCO

Kidolgozta: Dr. Nemes János

Kidolgozás dátuma: 2011.11.14.

Betegtájékoztató

- 1. Betegségemről (amennyiben már ismert), amely kórisme szerint magyarul / latinul**
Utóhályog (hátsó lencsetok megvastagodása)/ Cataracta secundaria
- 2. A javasolt vizsgálatokról / gyógymódokról, mely magyarul**
Általános szemészeti vizsgálat, szemészeti ultrahang vizsgálat. / A megvastagodott hátsó lencsetokon nyílás készítése.
- 3. Valamint annak kockázatáról:**
Szemnyomás emelkedés/csökkenés, szaruhártya borússág, a szem szöveteinek sérülése, műlencse sérülése, elmozdulása, vérzés, szemfájdalom, belső szemgyulladás, ideghártya vizenyő, ideghártya szakadás, leválás, látásvesztés, szemgolyó elvesztése.
- 4. A műtét során orvosilag indokolt esetleges további beavatkozások:**
A megvastagodott hátsó lencsetokon nyílás készítése műtéti úton, üvegtesti műtét / vitrectomia, műlencse csere, műlencse rögzítése varrattal.
- 5. A műtéthez szükséges érzéstelenítési eljárás:**
Helyi érzéstelenítés (Oxybuprokain csepp, szükség esetén az elülső csarnokba adott érzéstelenítő),
vagy
Vezetékes érzéstelenítés – szemgolyó mögé adott (retrobulbaris) érzéstelenítő injekció.
Az injekció beadását követően oculopressor nevű eszközzel nyomást gyakorolunk a szemre.
- 6. A retrobulbaris érzéstelenítés kockázatai**
Szemhéj véraláfutása, szemhéjcsüngés, kettőslátás, látóideg sérülése, szemgolyó falának sérülése, allergiás reakció a beadott anyagra, fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés, szapora pulzus, nagy mértékű vérnyomáscsökkenés, életveszélyes keringési zavar, gégeödéma, légzésleállítás, tudatzavar, görcsök, eszméletvesztés, halál
- 7. Egyéb megjegyzések:**
A beavatkozás után kímélő életmód javasolt, különösképpen fontos a seb és környékének kíméléte.